

Tüsistused

Mida HPV võib põhjustada?

- › Tüükad suguelundite ja päraku piirkonnas
- › Emakakaela-, suguelundite, päraku- ning pea- ja kaelapiirkonna vähk

Kellel on oht HPV-ga nakatuda?

- › Kõigil, kes on seksuaalselt aktiivsed.



Tõhus vaktsiin on kättesaadav kogu ELis.

Ärge jääge ootama!
Küsi oma arstilt
vaktsineerimise
kohta nõu.



Skaneerige QR-kood ja
lugege täpsemalt Euroopa
vaktsineerimise infoportaalist.
vaccination-info.europa.eu/en




AEG VAKTSINEERIDA

Kaitske oma lapsi HPV- ga (inimese papilloomiviirus) nakatumise eest



EUROOPA VAKTSINEERIMISE
TEABEPORTAAL
Euroopa Liidu algatus



on viirus, millel **ilmsed sümptomid** puuduvad, mistõttu on seda raske diagnoosida. Sellega nakatumine võib aga suurendada teie vähiriski.

Kes peaksid end vaktsineerima?

HPV vastu vaktsineerimist soovitatakse üldiselt nii tüdrukutele kui ka poistele. Korrapärane vaktsineerimine HPV vastu on tavaliselt ette nähtud 9–14 aasta vanuses.



Vaktsineerimine on parim võimalus kaitsta ennast ja teisi HPV ja selle tüsistuste eest.

