

## Sümptomid

- › Köha › Palavik
- › Aevastamine
- › Nohu › Vilistav hingamine

## Ennetamine



## › Vaktsineerimine/ immuniseerimine

- › Peske sageli käsi
- › Katke aevastamisel nina ja suu
- › Vältige kontakti haigetega
- › Haigena jääge koju

Ärge jääge ootama!  
Küsi oma arstilt  
vaktsineerimise  
kohta nõu.



Skaneerige QR-kood ja lugege  
täpsemalt **Euroopa vaktsineerimise infoportaalist.**

[vaccination-info.europa.eu/en](https://vaccination-info.europa.eu/en)




AEG VAKTSINEERIDA

## Kaitske ennast ja oma lähedasi RSV eest



EUROOPA VAKTSINEERIMISE  
TEABEPORTAAL  
Euroopa Liidu algatus



## **RSV** (respiratoor-süntsütiaalne viirus)

on väga nakkav.

See levib kergesti õhu kaudu ja võib põhjustada raskeid tüsistusi, nagu kopsupõletik, bronhioliit ja sepsis (vereringeinfektsioon, millega võivad kaasneda mitmesugused sümptomid, sealhulgas vererõhu langus).

## **Kes kuuluvad riskirühma?**

- › Alla 6 kuu vanused imikud
- › Enneaegselt sündinud
- › Üle 65-aastased, nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed või need, kellel juba on mõni haigus, näiteks diabeet, südame- või kopsuhaigus



Vaktsineerimise abil saate kaitsta ennast ja teisi raskekujulise RSV ja selle tüsistuste eest.

**Rasedad saavad end vaktsineerida ja tagada seeläbi vaktsiinikaitse ka oma vastsündinule, et teda selles õrnas eluetapis kaitsta.**

