




Sümptomid

Puukentsefaliit võib põhjustada meningiiti (pea- ja seljaaju ümbritseva membraani põletik) ja/või entsefaliiti (peaajupõletik).



Kaitske end vaktsineerimise abil!



Skaneerige QR-kood ja
lugege täpsemalt Euroopa
vaktsineerimise infoportaalist.
vaccination-info.europa.eu/en


AEG VAKTSINEERIDA



Kas olete puugihooajaks valmis? Kaitske end puukentsefaliidi eest



EUROOPA VAKTSINEERIMISE
TEABEPORTAAL
Euroopa Liidu algatus



on viiruslik nakkushaigus, mis kahjustab kesknärvisüsteemi. Võite selle saada nakatunud puugi hammustuse kaudu. Selliseid puuke leidub metsades või rohumaadel paljudes Euroopa ja Aasia piirkondades.



Kuidas võib puukentsefaliiti nakatuda?

Nakatuda võib puugi hammustuse kaudu.

Hammustada võib saada looduses viibides, näiteks matkates ja telkides ning pargis või metsas jalutades.



Miks vaktsineerida?

Vaktsineerimine on kõige tõhusam viis kaitsta end puukentsefaliidi ja selle võimalike elumuutvate tagajärgede eest.