

Vähendage oma vähiriski!

Laske end vaktsineerida B-hepatiidi ja HPV vastu



B-HEPATIIT

Miks vaktsineerida?

- › Pikaajaline B-hepatiidi nakkus võib põhjustada maksavähki.
- › B-hepatiidist on tingitud **iga üheksas** maksavähiga seotud surmajuhtum ELis/EMPis.
- › Umbes **3,2 miljonil** inimesel ELis/EMPis on pikaajaline B-hepatiidi nakkus ja seega risk haigestuda maksavähki.

Vaktsineerimine B-hepatiidi ja inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu aitab kaitsta nakkuste eest, mis võivad põhjustada vähki.

Soovite lisateavet?

Altpoolt leiate mõned olulised faktid.



HPV

Miks vaktsineerida?

- › HPV põhjustab meeste ja naiste peale kokku rohkem kui **33 000** uut vähijuhtu aastas.
- › Sellest on tingitud enamik emakakaelavähi juhtumitest.
- › See võib põhjustada ka kurguvähki ja muud liiki vähki.




Laiulatuslik vaktsineerimine aitaks ära hoida **90%** emakakaelavähi juhtumitest.

Vaktsineerimisega on võimalik B-hepatiidi ja HPV nakkust ning nendest tingitud vähki ennetada.

Kes peaksid end vaktsineerima?

B-hepatiidi vastu vaktsineerimine on ette nähtud laste vaktsineerimise tavaprogrammi raames. Seda soovitatakse ka täiskasvanutele, kellel on suurem risk nakatuda B-hepatiidiga.


B-HEPATIIT



Kes peaksid end vaktsineerima?

HPV vastu vaktsineerimist soovitatakse üldiselt nii tüdrukutele kui ka poistele. Korrapärane vaktsineerimine HPV vastu on tavaliselt ette nähtud **9–14 aasta** vanuses.


HPV



Arutage perearstiga, kuidas kaitsta vaktsineerimise abil ennast ja oma perekonda.



EUROOPA VAKTSINEERIMISE
TEABEPORTAAL
Euroopa Liidu algatus



Skaneerige QR-kood ja lugege täpsemalt Euroopa vaktsineerimise infoportaalist.

vaccination-info.europa.eu/en