

Sumažinkite vėžio riziką!

Skiepykitės nuo hepatito B ir ŽPV



HEPATITAS B

Kodėl reikia skiepytis?

- › Lėtinė hepatito B infekcija gali sukelti kepenų vėžį.
- › Hepatitas B yra **1** iš **9** mirčių nuo kepenų vėžio ES (EEE) priežastis.
- › Apie **3,2 mln.** žmonių ES (EEE) serga lėtine hepatito B infekcija ir jiems gresia kepenų vėžys.

Skiepai nuo hepatito B ir ŽPV (žmogaus papilomos viruso) padeda apsisaugoti nuo infekcijų, galinčių sukelti vėžį.

Norite sužinoti daugiau?

Štai keletas esminių faktų.



ŽPV

Kodėl reikia skiepytis?

- › Kasmet nuo ŽPV daugiau kaip **33 000** vyrų ir moterų susergera vėžiu.
- › Jis yra daugumos gimdos kaklelio vėžio atvejų priežastis.
- › Jis gali sukelti gerklės ir kitų rūšių vėžį.




Visuotinis skiepijimas galėtų užkirsti kelią **90 %** gimdos kaklelio vėžio atvejų.

Skiepijimas gali padėti išvengti hepatito B ir ŽPV sukeliamos infekcijos ir vėžio.


Kas turėtų skiepytis? HEPATITAS B

Skiepai nuo hepatito B įtraukti į standartines vaikų skiepijimo programas. Skiepytis taip pat rekomenduojama suaugusiems, kuriems yra didesnė hepatito B infekcijos rizika.




Kas turėtų skiepytis? ŽPV

Skiepytis nuo ŽPV dažnai rekomenduojama ir mergaitėms, ir berniukams. Paprastai nuo ŽPV skiepijami **9–14 metų** amžiaus vaikai.



Pasikalbėkite su savo sveikatos priežiūros specialistu apie tai, kaip skiepai gali apsaugoti jus ir jūsų šeimą.



Norėdami sužinoti daugiau, nuskenaukite QR kodą ir apsilankykite Europos skiepijimo informacijos portale

vaccination-info.europa.eu/en



EUROPOS SKIEPIJIMO
INFORMACIJOS PORTALAS
Europos Sąjungos iniciatyva