

Komplikācijas

HPV var izraisīt:

- › Dzimūrgānu un anālās atveres kārpas
- › Dzemdes kakla, dzimūrgānu, anālās atveres, dzimūlocekļa un dažu veidu galvas un kakla vēzi.

Kurš ir pakļauts HPV riskam?

- › Ikviens, kurš ir seksuāli aktīvs



Visā ES ir pieejama iedarbīga vakcīna.

Negaidiet! Konsultējieties ar savu ārstu, lai saņemtu padomu par vakcināciju.



Noskenējiet QR kodu, lai uzzinātu vairāk Eiropas Vakcinācijas informācijas portālā


vaccination-info.europa.eu/en



Aizsargājiēt savus bērnus no HPV infekcijām nākotnē (cilvēka papilomas vīruss)



EIROPAS VAKCINĀCIJAS
INFORMĀCIJAS PORTĀLS
Eiropas Savienības iniciatīva




HPV

ir vīruss, kam **nav acīmredzamu simptomu**,
tāpēc to ir grūti diagnosticēt. Tomēr, ja tas tiek
konstatēts, tas var palielināt risku saslimt ar vēzi.

Kam vajadzētu vakcinēties?

Vakcinācija pret HPV bieži tiek
ieteikta gan meitenēm, gan
zēniem. Profilaktiskā vakcinācija
pret HPV parasti notiek vecumā
no 9 līdz 14 gadiem.



9–14 gadi



Kāpēc vakcinēties?

Vakcinācija ir labākais veids, kā pasargāt
sevi un apkārtējos no HPV un tā
izraisītajām komplikācijām.

