




Symptômes

L'encéphalite à tiques peut engendrer une méningite (inflammation de la membrane qui entoure le cerveau et la moelle épinière) et/ou une encéphalite (inflammation du cerveau).



Protégez-vous en vous faisant vacciner!



Scannez le code QR pour en savoir plus sur le portail européen d'information sur la vaccination


vaccination-info.europa.eu/en



Préparez-vous pour la saison des tiques! Protégez-vous contre l'encéphalite à tiques



PORTAIL EUROPÉEN
D'INFORMATION SUR
LA VACCINATION
Une initiative de l'Union européenne



L'encéphalite à tiques

est une maladie infectieuse virale qui affecte le système nerveux central. Vous pouvez la contracter lors d'une morsure par une tique infectée, que l'on trouve dans des habitats boisés ou herbeux dans de nombreuses régions d'Europe et d'Asie.



Comment
contracte-t-on
l'encéphalite
à tiques?



En se faisant mordre par des tiques infectées.

Cela peut se produire lors d'activités de plein air telles que la randonnée, le camping, les promenades dans les parcs ou les forêts.



Pourquoi se faire vacciner?

La vaccination est le moyen le plus efficace de se protéger contre l'encéphalite à tiques et les conséquences qu'elle peut avoir sur votre vie.