

Védje magát a majomhimlő ellen

A majomhimlő olyan vírusfertőzés, amely az emberek közötti szoros érintkezés útján terjed, ideértve a szexuális érintkezést is.

26 000

Az első nagy majomhimlőjárvány 2022-ben tört ki először Európában és világszerte. 2022 óta több mint 26 000 esetet jelentettek az EU-ban.

Tünetek

A majomhimlő gyakran a következő tünetegyüttesel jár:

- › Láz vagy hidegrázás
- › Fejfájás
- › Kimerültség
- › Hátfájás és izomfájdalom
- › Bőrkkiütés vagy hólyagok

Szövődmények

A majomhimlő-fertőzést elkapó emberek többsége szövődmények nélkül felépül, azonban a súlyos tünetekkel küzdő betegek kórházi kezelésre szorulhatnak.


Hogyan terjed a majomhimlő?

Ember-ember közötti kapcsolat

Európában a közelmúltban a legtöbb majomhimlő-megbetegedés férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében fordult elő, ami arra utal, hogy a majomhimlő szexuális érintkezés útján terjed.

Miért van szükség védőoltásra?

A majomhimlő és szövődményei védőoltással megelőzhetők



Általános tanácsokért és a majomhimlő elleni védőoltásra való jogosultsággal kapcsolatban forduljon orvosához



Szkennelje be a QR-kódot, és további információkat talál az Európai Vakcinázási Információs Portálon

vaccination-info.europa.eu/en



EURÓPAI VAKCINÁZÁSI
INFORMÁCIÓS PORTÁL
Az Európai Unió kezdeményezése