

Tünetek

A majomhimlő gyakran a következő tünetegyüttesel jár:

- › Láz vagy hidegrázás
- › Fejfájás
- › Kimerültség
- › Hátfájás és izomfájdalom
- › Bőrkiütés vagy hólyagok


Szövődmények:

A majomhimlő-fertőzést elkapó emberek többsége szövődmények nélkül felépül, azonban a súlyos tünetekkel küzdő betegek kórházi kezelésre szorulhatnak.

Általános tanácsokért
és a majomhimlő
elleni védőoltásra
való jogosultsággal
kapcsolatban forduljon
orvosához




Szkennelje be a QR-kódot,
és további információkat
talál az Európai Vakcinázási
Információs Portálon
vaccination-info.europa.eu/en



Védje magát a majomhimlő ellen



EURÓPAI VAKCINÁZÁSI
INFORMÁCIÓS PORTÁL
Az Európai Unió kezdeményezése



Majomhimlő (mpox)

A majomhimlő egy vírusfertőzés, amely bőrhólyagokat, lázat, fejfájást és izomfájdalmat okoz. A vírus a fertőzött személlyel való szoros, közvetlen érintkezés útján terjed (beleértve a szexuális érintkezést is), de védőoltással megelőzhető.

Ki van veszélyben?

- › Bárki, aki szoros, közvetlen kapcsolatba került egy olyan személlyel (beleértve a szexuális kapcsolatot is), akinek majomhimlője van.
- › A legyengült immunrendszerű emberek nagyobb veszélynek lehetnek kitéve a majomhimlő és szövődményei miatt.



Miért van szükség védőoltásra?

A majomhimlő és szövődményei védőoltással megelőzhetők.

