



Simptome

Encefalita transmisă de căpușe poate duce la meningită (inflamarea membranei care înconjoară creierul și măduva spinării) și/sau encefalită (inflamarea creierului).



Protejați-vă prin vaccinare!




Pentru a afla mai multe, scanați codul QR pe Portalul european de informații despre vaccinare
vaccination-info.europa.eu/en



V-ați pregătit pentru sezonul căpușelor? Protejați-vă împotriva encefalitei transmise de căpușe



PORTALUL EUROPEAN DE
INFORMAȚII DESPRE VACCINARE
O inițiativă a Uniunii Europene



Encefalita transmisă de căpușe

este o infecție virală care afectează sistemul nervos central. O puteți lua prin mușcătura căpușelor infectate care se găsesc în habitatele împădurite sau ierboase din multe părți ale Europei și Asiei.



Cum se ia
encefalita
transmisă de
căpușe?

Prin mușcătura căpușelor infectate.

Aceasta se poate întâmpla în timpul activităților în aer liber, cum ar fi drumeții, camping și plimbări prin parcuri sau păduri.



De ce să vă vaccinați?

Vaccinarea este cea mai eficace cale de a vă proteja împotriva encefalitei transmise de căpușe și a posibilelor consecințe asupra vieții.