



Príznaky

Kliešťová encefalitída môže viesť k meningitíde (zápalu membrány obklopujúcej mozog a miechu) a/alebo encefalitíde (zápalu mozgu).



Chráňte sa očkovaním!



Naskenujte QR kód a dozviete sa viac na Európskom informačnom portáli o očkovaní


vaccination-info.europa.eu/en



Ste pripravení na sezónu kliešťov? Chráňte sa pred kliešťovou encefalitídou



EURÓPSKY INFORMAČNÝ
PORTÁL O OČKOVANÍ
Iniciatíva Európskej únie



TBE (kliešťová encefalitída)

je vírusové infekčné ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Môžete sa ňou nakaziť po uhryznutí infikovaným kliešťom, ktorý sa vyskytuje v lesných alebo trávnatých biotopoch v mnohých častiach Európy a Ázie.



Ako sa
kliešťovou
encefalitídou
nakazíte?

Uhryznutím infikovanými kliešťami.

Môže k tomu dôjsť počas aktivít vo vonkajšom prostredí, ako je turistika, kempovanie, prechádzky v parkoch alebo lesoch.



Prečo sa dať zaočkovať?

Očkovanie je najúčinnnejší spôsob, ako sa chrániť pred kliešťovou encefalitídou a jej následkami, ktoré vám môžu zmeniť život.