

Симптоми

- › кашлица
- › повишена температура
- › кихане
- › хрема
- › хрипове

Предпазване:



> Ваксиниране/ имунизация

- › Често мийте ръцете си
- › Покривайте носа и устата си, когато кихате
- › Избягвайте контакт с болни
- › Останете вкъщи, ако сте болни

Не чакайте! Обърнете се
към лекаря си за съвет
относно ваксинацията.




Сканирайте QR кода, за да
научите повече на **Европейския
портал за ваксиниране**
vaccination-info.europa.eu/en



Защитете себе си и близките си от РСВ



ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ
ЗА ВАКСИНИРАНЕ
Инициатива на Европейския съюз



РСВ (респираторният синцитиален вирус)

е силно заразен вирус.

Той се разпространява лесно по въздуха и може да причини тежки усложнения като пневмония, бронхиолит и сепсис (инфекция на кръвообращението, от която могат да се развият различни симптоми, включително спад в кръвното налягане).

Кой е най-изложен на риск?

- › Деца на възраст под 6 месеца
- › Преждевременно родени деца
- › Хора на възраст над 65 години и хора с отслабена имунна система или с предшестващи заболявания като диабет, сърдечни и белодробни заболявания



Защо да се ваксинирате?

Ваксинирането може да предпази вас и другите от тежко боледуване от РСВ и усложненията от този вирус.

Бременните жени могат да се ваксинират и да предадат тази защита на новороденото си дете, като го предпазят в критичен период от живота му.

