



Příznaky

- › kašel,
- › horečka,
- › kýchání,
- › rýma,
- › sípot.

Prevence:



> očkování/imunizace


- › Myjte si často ruce.
- › Při kýchání si zakryjte nos a ústa.
- › Vyhněte se kontaktu s nemocnými.
- › Pokud jste nemocní, zůstaňte doma.

**Na nic nečekejte! Poradte se
o očkování s lékařem.**



Naskenujte kód QR a dozvíte se
více na **evropském informačním
portálu o očkování.**


vaccination-info.europa.eu/en



Chraňte sebe i své blízké před virem RSV



EVROPSKÝ INFORMAČNÍ
PORTÁL O OČKOVÁNÍ
Iniciativa Evropské unie



RSV (respirační syncytiální virus)

je vysoce nakažlivý.

Snadno se šíří vzduchem a může způsobit závažné komplikace, jako je zápal plic, bronchiolitida a sepse (infekce krevního řečiště, která může vyvolat celou řadu příznaků, včetně poklesu krevního tlaku).

Kdo je nejvíce ohrožen?

- › děti mladší 6 měsíců,
- › předčasně narozené děti,
- › osoby starší 65 let a osoby s oslabenou imunitou nebo s již existujícími onemocněními, jako je cukrovka a onemocnění srdce či plic.



Proč se nechat očkovat?

Očkování může ochránit vás i ostatní před závažným onemocněním virem RSV a souvisejícími komplikacemi.

Těhotné ženy se mohou nechat očkovat a tuto ochranu předat novorozencům a chránit je tak během kritického období.

