



Simptomi:

- › kašalj
- › vrućica
- › kihanje
- › curenje iz nosa
- › piskanje pri disanju.

Prevenција:



› Cijepljenje/ imunizacija

- › Često perite ruke.
- › Pokrijte usta i nos kad kišete.
- › Izbjegavajte kontakt s bolesnim osobama.
- › Ostanite kod kuće ako se razbolite.

Nemojte čekati, obratite se
svojem liječniku za savjet
o cijepljenju.



Skenirajte crtični kod kako biste
saznali više na **Europskom portalu**
za informacije o cijepljenju


vaccination-info.europa.eu/en



Zaštitite sebe i svoje najmilije od RSV-a



EUROPSKI PORTAL ZA
INFORMACIJE O CIJEPLJENJU
Inicijativa Europske unije




RSV (respiratorni sincijski virus)

vrlo je zarazan virus.

Lako se širi zrakom i može uzrokovati teške komplikacije kao što su upala pluća, bronhiolitis i sepsa (infekcija krvotoka koja može uzrokovati različite simptome, uključujući pad krvnog tlaka).

Tko je najugroženiji?

- › Djeca mlađa od 6 mjeseci
- › Prerano rođena djeca
- › Osobe starije od 65 godina i osobe s oslabljenim imunosnim sustavom ili postojećim bolestima kao što su dijabetes, bolesti srca i pluća.



Zašto se cijepiti?

Cijepljenjem možete sebe i druge zaštititi od teškog oblika RSV-a i njegovih komplikacija.

Trudnice se mogu cijepiti i prenijeti tu zaštitu na novorođenčad te ih tako zaštititi u kritičnom trenutku.

