



Simptomi

- › Klepus
- › Drudzis
- › Šķaudīšana
- › Iesnas
- › Sēkšana

Profilakse:



› Vakcinācija/imunizācija

- › Bieži mazgājiet rokas
- › Aizsedziet degunu un muti šķaudīšanas laikā
- › Izvairieties no kontakta ar slimiem cilvēkiem
- › Palieciet mājās, ja esat slims

Negaidiet! Konsultējieties
ar savu ārstu, lai saņemtu
padomu par vakcināciju.




Noskenējiet QR kodu, lai uzzinātu
vairāk Eiropas Vakcinācijas
informācijas portālā
vaccination-info.europa.eu/en



Aizsargājiet sevi un savus tuviniekus no respiratori sincitiālā vīrusa (RSV)



EIROPAS VAKCINĀCIJAS
INFORMĀCIJAS PORTĀLS
Eiropas Savienības iniciatīva



RSV (respiratori sincitiālais vīruss)

ir ļoti lipīgs vīruss.

Tas viegli izplatās pa gaisu un var izraisīt smagas komplikācijas, piemēram, pneimoniju, bronholītu un sepsi (asinsrites infekciju, izraisot dažādus simptomus, tostarp asinsspiediena pazemināšanos).

Kurš ir visvairāk pakļauts riskam?

- › Bērni līdz sešu mēnešu vecumam
- › Priekšlaicīgi dzimuši bērni
- › Cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, un cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu vai jau esošām slimībām, piemēram, diabētu, sirds slimību un plaušu slimību



Kāpēc vakcinēties?

Vakcinācija var pasargāt jūs un apkārtējos no smagas RSV slimības gaitas un tās komplikācijām.

Grūtnieces var vakcinēties un nodot šo aizsardzību savam jaundzimušajam, tādējādi aizsargājot to kritiskā brīdī.

